中枢神経原発リンパ腫［PCNSL］

MTX 大量療法

				Week	1	…	2	…	3	…	4	…	5	…
MTX	メソトレキセート	3g /m^2		点滴静注	↓				↓				↓	
DEX	デキサート	8mg/body	各2日間	点滴静注	↓				↓				↓	
VCR	オンコビン	1mg /m^2		静注	↓				↓				↓	
PCZ	プロカルバジン*不採用	100mg /m^2	各7日間	内服	⇔				⇔				⇔	

←週毎に記載！

			Day	1	…	4	…	11	…	18	…	25	…	32	…	39	…
MTX	メソトレキセート	10mg /body	髄腔内			↓		↓		↓		↓		↓		↓	

Bonn chemotherapy protocol

Cycle A			Day	1	2	3	4	5
MTX	メソトレキセート	5g /m^2	点滴静注	↓				
VCR	オンコビン	2mg /body	静注	↓				
Ifos	イホマイド	800mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓	↓
DEX	デカドロン	10mg /m^2	内服		↓	↓	↓	↓
PSL	プレドニン	2.5mg /m^2	髄腔内	↓	↓	↓	↓	
MTX	メソトレキセート	3mg /m^2	髄腔内	↓	↓	↓	↓	
Ara-C	シタラビン	30mg /m^2	髄腔内					↓

Cycle B			Day	1	2	3	4	5
MTX	メソトレキセート	5g /m^2	点滴静注	↓				
VCR	オンコビン	2mg /body	静注	↓				
CPA	エンドキサン	200mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓	↓
DEX	デカドロン	10mg /m^2	内服		↓	↓	↓	↓
PSL	プレドニン	2.5mg /m^2	髄腔内	↓	↓	↓	↓	
MTX	メソトレキセート	3mg /m^2	髄腔内	↓	↓	↓	↓	
Ara-C	シタラビン	30mg /m^2	髄腔内					↓

Cycle C			Day	1	2	3	4	5	6	7
Ara-C	シタラビンN＊用時	3g /m^2	点滴静注	↓	↓					
VDS	フィルデシン	5mg /body	静注	↓						
DEX	デカドロン	20mg /m^2	内服			↓	↓	↓	↓	↓
PSL	プレドニン	2.5mg /m^2	髄腔内			↓	↓	↓	↓	
MTX	メソトレキセート	3mg /m^2	髄腔内			↓	↓	↓	↓	
Ara-C	シタラビン	30mg /m^2	髄腔内							↓

MTX + Ara-C 療法

				Day	1	…	8	…	…	22	23	…	…	43	44	…	…
MTX	メソトレキセート	1g /m^2		点滴静注	↓		↓										
Ara-C	シタラビンN＊用時	3g /m^2	各2日間	点滴静注						↓	↓			↓	↓		

☆Day 1～14の間に計4回、Ara-Cの前後に計4回3剤髄注を行う。

3剤髄注	MTX(ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ)：15mg + Ara-C(シタラビン)：40mg + PSL(ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ)：10mg

中枢神経原発リンパ腫［PCNSL］

Rituximab + Temozolomide 療法

導入療法

			Day	1	2	3	4	5	…	28
RTX	リツキサン注	375mg /m^2	点滴静注	↓						
	テモダールｶﾌﾟｾﾙ	150mg /m^2	内服	→	→	→	→	→		
				28日１コース　最大4コース						

維持療法

			Day	1	2	3	4	5	…	28
	テモダールｶﾌﾟｾﾙ	150-200mg /m^2	内服	→	→	→	→	→		
				28日1コース　最大8コース						

R-MPV療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	…	14
RTX	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓									
MTX	メソトレキセート	3.5g /m^2	点滴静注		↓								
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	静脈注射		↓								
PCZ	プロカルバジン	100mg /m^2	内服	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休

*PCZは奇数サイクルのみ　　1コース2週間　　5～7コース施行（症例によって髄注併用）

↓　　寛解後、全脳照射

AraC大量療法（地固め療法）

			Day	1	2	…	28
AraC	シタラビン	3g /m^2	点滴静注	↓	↓		
				1コース28日間　2コース施行			

チラブルチニブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ベレキシブル錠	1日１回480mg、空腹時	内服	→	→	→	→
				連日服用			