骨髄増殖性疾患（真性多血症、本態性血小板増多症、本態性血小板血症、骨髄線維症）

サイメリン単独療法（真性多血症、本態性血小板増多症）

			Day	1	…	42	(…	56)
MCNU	サイメリン	50-90 mg /m^2	点滴静注	↓				
				６－８週に１回				

シクロホスファミド内服療法（真性多血症）

			Day	1	2	3	…
CPA	エンドキサン	100-200 mg/body	内服	→	→	→	→
				連日内服			

ルキソリチニブ内服療法（骨髄線維症）

			Day	1	2	3	…
	ジャカビ	1回5-25mg、1日2回	内服	→	→	→	→
				1日2回、12時間毎を目安に経口投与			

ルキソリチニブ内服療法(真性多血症)

			Day	1	2	3	…
	ジャカビ	1回10-25mg、1日2回	内服	→	→	→	→
				1日2回、12時間毎を目安に経口投与			
				(1回10mgを開始用量とし、1回25mgを超えないこと。)			

ヒドロキシカルバミド内服療法（真性多血症、本態性血小板血症）

			Day	1	2	3	…
	ハイドレア	500-2000mg分1-3	内服	→	→	→	→
				連日内服			

↓ 寛解導入後の維持

			Day	1	2	3	…
	ハイドレア	500-1000mg分1-2	内服	→	→	→	→
				連日内服			