慢性骨髄性白血病［CML］

スプリセル 療法

［慢性期］

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Dasatinib	スプリセル*用時	100mg /日 分1	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

［急性期・移行期］

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Dasatinib	スプリセル*用時	140～180mg/日 分2	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

タシグナ 療法

［慢性期・移行期］

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Nilotinib	タシグナ*用時	800mg /日 分2	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

空腹時、12時間おき投与

グリベック 療法

［慢性期］

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Imatinib	グリベック	400-600mg /日 分1	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

［急性期・移行期］

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Imatinib	グリベック	600-800mg /日 分1～2	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

ボシュリフ療法

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Bosutinib	ボスチニブ	500mg /日 分1	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

アイクルシグ療法

			Day	1	…	…	…	…	…	…
Ponatinib	ポナチニブ	45mg /日 分1	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日経口投与						

セムブリックス療法

			Day	1	…	…	…	…	…	…
	アシミニブ	80mｇ /日 分2	経口	→	→	→	→	→	→	→
				連日内服、空腹時内服						

ヒドロキシカルバミド内服療法

			Day	1	2	3	…
	ハイドレア	500-2000mg、分1-3	内服	→	→	→	→
				連日内服			

↓ 寛解導入後の維持

			Day	1	2	3	…
	ハイドレア	500-1000mg、分1-2	内服	→	→	→	→
				連日内服			