卵巣癌［Ovarian Cancer］

weekly PAC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
PAC	パクリタキセル	70mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
				28日(4週)1コース								

weekly TC 療法

				1	…	8	…	15	…
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓					
PAC	パクリタキセル	80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓	
				21日(3週)1コース					

tri-weekly TC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
PAC	パクリタキセル	175mg /m^2	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

DTX+CBDCA 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
DTX	ドセタキセル	70mg /m^2	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

×6コース

DTX療法

			Day	1	…	21	
DTX	ドセタキセル	70mg /m^2	点滴静注	↓			
				21日(3週)1コース			

GEM 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
GEM	ゲムシタビン	800～1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
骨髄抑制が強い場合はDay 8またはDay15を休薬				28日(4週)1コース								

CPT-11 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
CPT-11	イリノテカン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
				28日(4週)1コース								

CPT-11 + CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
CPT-11	イリノテカン	60mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓				
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注	↓								
				28日(4週)1コース								

VP-16 内服 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
VP-16	ラステットS	50mg /m^2	内服	→	→	→	→	→	→	休	
				Day 1～21まで内服							
				28日(4週)1コース							

卵巣癌［Ovarian Cancer］

PLD[Doxil] 療法

			Day	1	…	…	…	…	…	…	28
PLD	ドキシル	50mg /m^2	点滴静注	↓							
				28日(4週)1コース							

CDDP IP 療法

			Day	1	…	…	…	…	…
CDDP	シスプラチン	100mg /m^2	腹腔内	↓					
				単回または月1回					

Nogitecan 療法

			Day	1	2	3	4	5	…	…	21
Nogitecan	ハイカムチン*用時	1.5mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓			
				21日(3週)1コース							

BV + TC 療法

			Day	1	…	…	…	…	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓					
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓					
PAC	パクリタキセル	175mg /m^2	点滴静注	↓					
				21日(3週)1コース					

BV＋PLD[Doxil] 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	28
BV	アバスチン	10mg /kg	点滴静注	↓				↓		
PLD	ドキシル	40mg /m^2	点滴静注	↓						
				28日(4週)1コース						

BV＋weeklyPAC療法

			Day	1	…	8	…	15	…	28
BV	アバスチン	10mg /kg	点滴静注	↓				↓		
PAC	パクリタキセル	80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		
				28日(4週)1コース						

【患者限定】BV+GEM療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				21日（3週）1コース						

BV+GEM+CBDCA療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=4	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
				21日（3週）1コース						

卵巣癌［Ovarian Cancer］

GEM+CBDCA 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
CBDCA	カルボプラチン	AUC= 4	点滴静注	↓						
				21日（3週）1コース						

PLD[Doxil]-C療法

			Day	1	…	21
PLD	ドキシル	30mg /m^2	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

PLD+CBDCA+BEV

			Day	1	…	15	…	28
PLD	ドキシル	30mg /m^2	点滴静注	↓				
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓				
BV	アバスチン	10mg /kg	点滴静注	↓		↓		
				28日(4週)1コース× 計6サイクル				

↓

維持療法

			Day	1	…	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

NDP+PTX療法

			Day	1	…	21
NDP	アクプラ	80mg /m^2	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	175mg /m^2	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

オラパリブ内服療法

			Day	1	2	3	…	…	…
	リムパーザ錠	300mg×2回 /body	内服	→	→	→	→	→	→
				連日内服					

患者の状態により適宜減量

ニラパリブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ゼジューラｶﾌﾟｾﾙ	200mg /body	内服	→	→	→	→
				連日内服			

※初回投与前の体重が77kg以上かつ血小板数が150,000/μL以上の成人には1日1回300mg。

卵巣癌［Ovarian Cancer］

BV+オラパリブ療法

			Day	1	…	21
BV	アバスチン注	15mg /kg	点滴静注	↓		
	リムパーザ錠	300mg×2回 /body	内服	→	→	→
				1コース21日間		

・アバスチン：抗がん薬併用時とあわせて最長15ヵ月/計22サイクル

・リムパーザ：2年間or病勢進行が認められるまで継続投与

BV+Nogitecan療法

			Day	1	2	3	4	5	…	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓						
NGT	ハイカムチン	1.25mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓		
				1コース3週間						

患者限定　BV+CPT-11療法

			Day	1	…	15	…	28
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓				
CPT-11	イリノテカン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		
				1コース28日間				