頭頸部癌

TS-1（4W2R）療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
				4週間内服、2週間休薬											
				42日(6週)を1コース											

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

TS-1（2W1R）療法

			Day	1	…	8	…	15	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休
				2週間内服、1週間休薬					
				21日(3週)を1コースで計2コース					

S-1 + CBDCA療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	→	→	休
CBDCA	カルボプラチン	AUC=2.5	点滴静注			↓				
			S-1:3週間内服、2週間休薬							
			35日(5週)1コース							

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

CDDP単独 療法

			Day	1	…	8	…	15	…
CDDP	シスプラチン	100mg /m^2	持続静注	↓					
				21日間(3週)で1コース					

※放射線（70Gy)併用可

DTX+CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注	↓						
DTX	ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓						
				28日間(4週)で1コース						

放射線併用 Weekly CDDP 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
CDDP	シスプラチン	40mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		(↓)		(↓)	
				4～6週 連続投与											

頭頸部癌

DTX+CDDP 動注療法

			Day	1
CDDP	シスプラチン	90mg /日	動注	↓
DTX	ドセタキセル	50mg /日	動注	↓

CDDP + 5-FU 療法

			Day	1	2	3	4	5	…	…	28
5-FU		700mg /m^2	持続静注	→	→	→	→	→	休		
CDDP	シスプラチン	80～100mg /m^2	点滴静注	↓							
				28日(4週)1コース							

FP-RT 療法

			Day	1	2	3	4	…	…	…	28
5-FU		700mg /m^2	持続静注	→	→	→	→	休			
CDDP	シスプラチン	70mg /m^2	点滴静注	↓							
＊RT：1.8Gy×30と併用				28日(4週)1コース×２							

5-FU持続動注療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8
5-FU		250mg /日	持続動注	→	→	→	→	→	→	→	→

DTX 療法

			Day	1	…	15	…	22	…	(28)	…
DTX	ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓							
		（最大75㎎/m2）		3～4週を1コース							

放射線併用 weekly DTX 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
DTX	ドセタキセル	10mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
				週1回 6週連続投与											

S-1(4W2R)併用放射線療法

			Day	1	…	22	…	29	…	36	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休	休	休
				4週間内服、2週間休薬							
				42日(6週)を1コース							

エスワンタイホウ　投与量（標準より少ない）	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^2未満	25mg/回
1.25m^2～1.5m^2未満	40mg/回
1.5m^2以上	50mg/回

頭頸部癌

S-1(2W1R)併用放射線療法

			Day	1	…	8	…	15	…	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休	休
				2週間内服、1週間休薬						
				21日(3週)を1コース						

エスワンタイホウ　投与量（標準より少ない）	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	25mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	40mg/回
1.5m^{2}以上	50mg/回

TPF 療法

			Day	1	2	3	4	…	…	…	28
DOC	ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓							
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注	↓							
5-FU		600mg /m^2	点滴静注	→	→	→	→				
				28日を1コース							

ピシバニール局注 療法

			Day	1	…	15	…	22	…	28	…
OK432	ピシバニール	5～10KE /回	局注								
				毎日または数日に1回							

同日内に2経路による投与は行わない

Cmab単独 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
Cmab	アービタックス	初回：400mg/m^2、 2回目～：250mg/m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓	
				毎週投与(6回以上繰り返し可)							

Cmab + FP 療法

			Day	1	2	3	4	…	8	…	15	…
Cmab	アービタックス	初回：400mg/m^2、 2回目～：250mg/m^2	点滴静注	↓					↓		↓	
CDDP	シスプラチン	100mg /m^2	点滴静注	↓								
5-FU		1000mg /m^2	点滴静注	→	→	→	→	休				
				21日(3週)1コース								

Cmab + CBDCA + PAC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
Cmab	アービタックス	初回：400mg/m^2、 2回目～：250mg/m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
CBDCA	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
PTX	パクリタキセル	80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
				42日(6週)1コース											

頭頸部癌

Cmab + CBDCA + PAC 療法（2W1R）

			Day	1	…	8	…	15	…
Cmab	アービタックス	初回：400mg/m^2、2回目～：250mg/m^2	点滴静注	↓		↓		↓	
CBDCA	カルボプラチン	AUC=1.5-2.5	点滴静注	↓		↓			
PTX	パクリタキセル	60-100mg /m^2	点滴静注	↓		↓			
				21日(3週)1コース					

放射線治療併用　Cmab 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
Cmab	アービタックス	初回：400mg 2回目～：250mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓	
				毎週投与(7回まで繰り返し)							

ニボルマブ療法

			Day	1	…	14
Nivolumab	オプジーボ	240mg/body	点滴静注	↓		
				14日（2週）1コース		

放射線併用 Weekly CBDCA 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…	43
CBDCA	カルボプラチン	AUC=1.5-2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
				連続投与												

ペムブロリズマブ療法

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
				42日（6週）1コース				

頭頸部癌

ペムブロリズマブ＋CDDP + 5-FU 療法

			Day	1	2	3	4	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓					
5-FU		1000mg /m^2	持続静注	→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	100mg /m^2	点滴静注	↓					

21日（3週）1コース　×6コース

↓　6コース後、キイトルーダ単独へ移行

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

21日（3週）1コース

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

ペムブロリズマブ＋CBDCA + 5-FU 療法

			Day	1	2	3	4	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓					
5-FU		1000mg /m^2	持続静注	→	→	→	→	休	
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓					

21日（3週）1コース　×6コース

↓　6コース後、キイトルーダ単独へ移行

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

21日（3週）1コース

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース

セツキシマブ　サロタロカンナトリウム療法

			Day	1	…	28
	アキャルックス	640mg /m^2	点滴静注	↓		

点滴終了20～28時間後にレーザ光を病巣部位に照射

28日（4週）1コース、最大4コース

頭頸部癌

Cmab療法（隔週）

			Day	1	…	8	…	15	…	22
Cmab	アービタックス	500mg /m^2	点滴静注	↓		休		↓		休
				隔週投与						

患者限定　CDDP 療法（透析患者、放射線併用可）

			Day	1	2	3	4	5	6	7
CDDP	シスプラチン	10mg/body	点滴静注	↓		↓		↓		
				週3回　毎透析前に						