非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

CHOP 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓							
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓							
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース × 8コース							

R-CHOP 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	…	…	21
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓								
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注		↓							
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注		↓							
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注		↓							
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服		↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース × 8コース								

THP-COP 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
THP-ADM	テラルビシン	30mg /m^2		点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	500mg /m^2		点滴静注	↓							
VCR	オンコビン	1mg /m^2	最大2mg	静注	↓							
PSL	プレドニン	30mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース × 8コース							

若年成人用THP-COP 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
THP-ADM	テラルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓							
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓							
PSL	プレドニン	60mg /日		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース							

THP-COP-E 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
THP-ADM	テラルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓							
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓							
VP-16	エトポシド	60mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓					
PSL	プレドニン	100mg /日		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース							

CHOEP-21 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓							
VCR	オンコビン	2mg /body		静注	↓							
VP-16	エトポシド	100mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓					
PSL	プレドニン	100mg /body		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					21日(3週)1コース							

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

Rituximab 療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓		↓		↓		↓	
					28日(4週)1コース							

Rituximab維持 療法

				Day	1	…	56
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓		
					56日(8週)1コース		

Bendamustine 療法

				Day	1	2	…	…	…	21
Bendamustine	トレアキシン	120mg /m^2		点滴静注	↓	↓				
					21日(3週)1コース					

MECP 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
CBDCA	カルボプラチン	300mg /m^2		点滴静注	↓							
VP-16	エトポシド	70mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓			
(または経口で1日140mg /m^2)												
MIT	ノバントロン	8mg /m^2		点滴静注	↓							
PSL	プレドニン	40mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓			
					3～4週ごと							

R-MECP 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	…	…	21
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓								
CBDCA	カルボプラチン	300mg /m^2		点滴静注		↓							
VP-16	エトポシド	70mg /m^2		点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓			
(または経口で1日140mg /m^2)													
MIT	ノバントロン	8mg /m^2		点滴静注		↓							
PSL	プレドニン	40mg /m^2		内服		↓	↓	↓	↓	↓			
					3～4週ごと								

ESAHP 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21
VP-16	エトポシド	40mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓	↓				
m-PSL	ソル・メルコート	500mg /body		点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓			
Ara-C	シタラビンN＊用時	2000mg /m^2	×2	点滴静注					↓↓			
CDDP	シスプラチン	25mg /m^2	/day	持続静注	→	→	→	→				
					3～4週ごと							

CHASE 療法

				Day	1	2	3	4	5	…	…	21	
CPA	エンドキサン	1200mg /m^2		点滴静注	↓								
Ara-C	シタラビンN＊用時	2000mg /m^2		点滴静注		↓	↓						
VP-16	エトポシド	100mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓						
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注	↓	↓	↓						
G-CSF	グランｼﾘｼﾞ	2μg /kg		皮下注					(↓)	(↓)			WBC<2000で開始
					3～4週ごと								

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

CHASER 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	…	…	21	
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓									
CPA	エンドキサン	1200mg /m^2		点滴静注		↓								
Ara-C	シタラビンN＊用時	2000mg /m^2		点滴静注			↓	↓						
VP-16	エトポシド	100mg /m^2		点滴静注		↓	↓	↓						
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注		↓	↓	↓						
G-CSF	グランｼﾘﾝｼﾞ	2μg /kg		皮下注						(↓)	(↓)			WBC<2000
					3～4週ごと									で開始

DeVIC 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	…	…	21
CBDCA	カルボプラチン	300mg /m^2		点滴静注	↓								
VP-16	エトポシド	100mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓						
IFM	イホマイド	1500mg /m^2		点滴静注	↓	↓	↓						
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注	↓	↓	↓						
					3週ごと×4コース								

R-DeVIC 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	7	…	…	21
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓									
CBDCA	カルボプラチン	300mg /m^2		点滴静注		↓								
VP-16	エトポシド	100mg /m^2		点滴静注		↓	↓	↓						
IFM	イホマイド	1500mg /m^2		点滴静注		↓	↓	↓						
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注		↓	↓	↓						
					3週ごと×4コース									

Hyper-CVAD + MTX/Ara-C 療法　[A→B→A→B]

A) Hyper-CVAD 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CPA	エンドキサン	300mg /m^2	×2	点滴静注	↓↓	↓↓	↓↓											
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注				↓										
VCR	オンコビン	2mg /body		静注				↓							↓			
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓

B) MTX / Ara-C 療法

				Day	1	2	3	4	…	Day	1	2	3	4	…
MTX	メソトレキセート	200mg /m^2		点滴静注	↓					または	↓				
MTX	メソトレキセート	800mg /m^2		持続静注	→						→				
Ara-C	シタラビンN＊用時	3000mg /m^2	×2	点滴静注		↓↓	↓↓						↓↓	↓↓	
m-PSL	ソル・メルコート	50mg /body×2		点滴静注	↓↓	↓↓	↓↓				(↓↓)		↓↓	↓↓	

VNCOP-B 療法（対象：60歳以上の高齢者）

				Day	1	2	3	4	5	6	7	8	←週毎に記載！！
CPA	エンドキサン	300mg /m^2		点滴静注	↓		↓		↓		↓		
MIT	ノバントロン	10mg /m^2		点滴静注	↓		↓		↓		↓		
VCR	オンコビン	2mg /body		静注		↓		↓		↓		↓	
VP-16	エトポシド	150mg /m^2		点滴静注		↓				↓			
BLM	ブレオ	10mg /m^2		点滴静注				↓				↓	
PSL	プレドニン	40mg /m^2		内服	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	(漸減)

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

ProMACE-CytaBOM 療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADM	ドキソルビシン	25mg /m^2	点滴静注	↓												
CPA	エンドキサン	650mg /m^2	点滴静注	↓												
VP-16	エトポシド	120mg /m^2	点滴静注	↓												
Ara-C	シタラビン	300mg /m^2	点滴静注								↓					
BLM	ブレオ	5mg /m^2	点滴静注								↓					
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	静注								↓					
MTX	メソトレキセート	120mg /m^2	点滴静注								↓					
PSL	プレドニン	60mg /m^2	内服	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
				21日(3週) 1コース												

Cladribine 療法［ヘアリーセル白血病、低悪性度非ホジキンリンパ腫］

			Day	1	2	3	4	5	6	7	…	…	28
2-CdA	ロイスタチン*用時	0.09mg /kg	持続静注	→	→	→	→	→	→	→			
				28日(4週)1コース									

R-FCM 療法

			Day	1	2	3	4		…	…	28
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓							
MIT	ノバントロン	8mg /m^2	点滴静注		↓						
Fuldarabine	フルダラ*不採用	25mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓				
CPA	エンドキサン	200mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓				
				28日(4週)1コース							

＊内服では40mg/m^2

R-Hyper-CVAD + MTX/Ara-C 療法　[A→B→A→B]

A) R-Hyper-CVAD 療法

				Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓														
CPA	エンドキサン	300mg /m^2	×2	点滴静注		↓↓	↓↓	↓↓											
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注					↓										
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2		静注					↓							↓			
DEX	デキサート	40mg /body		点滴静注		↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓

B) MTX / Ara-C 療法

				Day	1	2	3	4	…
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2		点滴静注	↓				
MTX	メソトレキセート	200mg /m^2		点滴静注		↓			
MTX	メソトレキセート	800mg /m^2		持続静注		→			
Ara-C	シタラビンN＊用時	3000mg /m^2	×2	点滴静注			↓↓	↓↓	

Ara-Cは、年齢60歳以上またはCre：1.5以上のときは1000mg/㎡を1日2回

Rituximab + Fludarabine 療法

			Day	1	2	3	4	5	…	28
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓						
Fludarabine	フルダラ	25mg /m^2	静注	↓	↓	↓	↓	↓		
		または	70歳以上は3日間に短縮							
		40mg /m^2	内服	↓	↓	↓	↓	↓		
			28日(4週)を1コース、6コースまで							

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

R-ICE 療法

			Day	1	2	3	4	5	…	…	14
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓							
IFOS	イホマイド	5000mg /m^2	点滴静注				↓				
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5 (max:800mg)	点滴静注				↓				
VP-16	エトポシド	100mg /m^2	点滴静注			↓	↓	↓			
				14日を1コース							

modified R-ICE 療法

			Day	1	2	3	4	5	6	…	28
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓							
IFOS	イホマイド	1200mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓		
CBDCA	カルボプラチン	400mg /m^2	点滴静注		↓						
VP-16	エトポシド	100mg /m^2	点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓		
				28日を1コース							

GCD療法

			Day	1	2	3	4	…	…	8	…	…	21
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓						↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓									
DEX	デキサメタゾン	40mg /body	点滴静注 又は内服	↓	↓	↓	↓						
				21日(3週)1コース									

GCD-R療法

			Day	1	2	3	4	…	…	8	…	…	21
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓						↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓									
DEX	デキサメタゾン	40mg /body	点滴静注 又は内服	↓	↓	↓	↓						
Rituximab	リツキサン※	375mg /m^2	点滴静注							↓			
				21日(3週)1コース									

※CD20陽性例のみリツキサン併用

GDP療法

			Day	1	2	3	4	…	8	…	15	…
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓					↓			
CDDP	シスプラチン	25mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓						
DEX	デキサート	40mg /body	点滴静注	↓	↓	↓	↓					
				21日(3週)1コース								

GEM 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休	
				28日(4週)1コース							

ゼヴァリン単独療法

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
リツキサン注	250 mg/m^2	点滴静注	→						→	(→)	(→)
ゼヴァリン　インジウム	130 MBq	静脈注射	→								
ゼヴァリン　イットリウム	14.8 MBq/kg	静脈注射							→	(→)	(→)
			1コースのみ								

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

DA-EPOCH-R療法

			Day	1	2	3	4	5	6	…	21
RTX	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓							
VP16	エトポシド	50mg /m^2	点滴静注	→	→	→	→				
VCR	オンコビン	0.4mg /m^2	点滴静注	→	→	→	→				
DXR	ドキソルビシン	10mg /m^2	点滴静注	→	→	→	→				
PSL	プレドニン	120mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓			
CPA	エンドキサン	750mg /m^2	点滴静注					↓			
				1コース21日							

□ ANC nadir＞500…用量レベル1上げる
□ ANC nadir＜500（採血 2pointまで）…用量レベル維持
□ ANC nadir＜500（採血 3point以上）or Plt nadir＜25000…用量レベル1下げる
□ 用量レベル-1,-2は**CPAのみの減量となることに注意**

用量レベル	-2	-1	1	2	3	4	5	6
エトポシド(mg/m^2)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
ドキソルビシン(mg/m^2)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
エンドキサン(mg/m^2)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

SC-EPOCH-RR療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	…	21
RTX	リツキサン	375gm /m^2	点滴静注	↓							↓		
VP16	エトポシド	50mg /m^2	持続静注	→	→	→	→						
VCR	オンコビン	0.4mg /m^2	持続静注	→	→	→	→						
DXR	ドキソルビシン	10mg /m^2	持続静注	→	→	→	→						
PSL	プレドニン	60mg /m^2	内服	↓	↓	↓	↓	↓					
CPA	エンドキサン	750mg /m^2	点滴静注					↓					
				1コース21日									

用量レベル	1	-1	-2
エンドキサン(mg/m^2)	750	563	375

VR-CAP療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	…	21
Bor	ベルケイド	1.3mg /m^2	皮下注	↓			↓				↓			↓		
RTX	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓												
CPA	エンドキサン	750mg /m^2	点滴静注		↓											
ADR	ドキソルビシン	50mg /m^2	点滴静注		↓											
PSL	プレドニン	50mg /m^2	内服		↓	↓	↓	↓	↓							
				21日間（3週）1コース												

MTX-HOPE療法

			Day	1	2	3	4	…
MTX	メソトレキセート	20mg /body	内服	→				
VCR	オンコビン	1mg /body	静注		↓			
	ペラゾリン	400mg /body	内服			→	→	
VP16	エトポシド	25mg /body	内服			→	→	
				1コース2～3週間				

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

R-bendamustine 療法

			Day	1	2	3	…	…	…	28
Rituximab	リツキサン※1	375mg /m^2	点滴静注	↓						
Bendamustine	トレアキシン※2	90mg /m^2	点滴静注		↓	↓				
			28日を1コース							
			4コース（6コースまで可能）							

※再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の場合は、トレアキシン投与量、投与間隔異なるため注意
※1：ﾘﾂｷｻﾝは1コース目の7日前と最終コースの28日後に追加可能
※2：2コース目からﾄﾚｱｷｼﾝはDay1,2でも可

R-bendamustine 療法　※再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

			Day	1	2	3	…	21
Rituximab	リツキサン	375mg /m^2	点滴静注	↓				
Bendamustine	トレアキシン	120mg /m^2	点滴静注		↓	↓		
			21日を1コース（最大6サイクル）					

Cladribine+Rituximab 療法［ヘアリーセル白血病］

			Day	1	…	5	…	8	…	15	…	22	…	29	…
2-CdA	ロイスタチン*用時	0.12mg /kg	点滴静注	→	→	→									
Rituximab	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓				↓		↓		↓		↓	

→	36	…	43	…	50	…
	↓		↓		↓	

↓ロイスタチン治療後で血液中にMRDが検出された後に治療後6か月以上経過してから単剤投与へ移行

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
Rituximab	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	

→	43	…	50	…
	↓		↓	

Polatuzumab＋BR療法

【1コース目】

			Day	1	2	3	…	…	21
	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓					
	ポライビー	1.8mg /kg	点滴静注		↓				
	トレアキシン	90mg /m^2	点滴静注		↓	↓			
			21日1コース						

【2コース目以降】・

			Day	1	2	3	…	…	21
	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓					
	ポライビー	1.8mg /kg	点滴静注	↓					
	トレアキシン	90mg /m^2	点滴静注	↓	↓				
			21日1コース						

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

Pola-R-CHP療法

【1-6コース目】

			Day	1	2	3	4	5	6	…	21
Rituximab	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓							
	ポライビー	1.8mg mg/kg	点滴静注		↓						
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2	点滴静注		↓						
CPA	エンドキサン	750mg /m^2	点滴静注		↓						
PSL	プレドニン	100mg /body	点滴静注		↓	↓	↓	↓	↓		
				1コース3週間							

↓

【7-8コース目】

			Day	1	…	21
Rituximab	リツキシマブ	375mg /m^2	点滴静注	↓		
				1コース3週間		

DA-EPOCH-R/HD-MTX療法　［A 4コース→B　2コース→A　4コース］

A）DA-EPOCH-R療法			Day	1	2	3	4	5	…	21
RTX	リツキシマブ	375 mg/m^2	点滴静注	↓						
ETP	エトポシド	50 mg/m^2	点滴静注	→	→	→	→			
DXR	ドキソルビシン	10 mg/m^2	点滴静注	→	→	→	→			
VCR	オンコビン	0.4 mg/m^2	点滴静注	→	→	→	→			
CPA	シクロホスファミド	750 mg/m^2	点滴静注					↓		
PSL	プレドニン	120 mg/m^2	内服	→	→	→	→	→		
				21日サイクル　×　4コース						

□ ANC nadir＞500…用量レベル1上げる
□ ANC nadir＜500（採血 2pointまで）…用量レベル維持
□ ANC nadir＜500（採血 3point以上）or Plt nadir＜25000…用量レベル1下げる
□ 用量レベル-1,-2は**CPAのみの減量となることに注意**

用量レベル	-2	-1	1	2	3	4	5	6
エトポシド(mg/m^2)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
ドキソルビシン(mg/m^2)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
エンドキサン(mg/m^2)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

↓

B）HD-MTX療法			Day	1	…	14
MTX	メソトレキセート	3500 mg/m^2	点滴静注	↓		
				14日サイクル　×　2コース		

エトポシド内服療法（A法）

			Day	1	2	3	4	5	…	26
VP16	ラステットS	175-200 mg/body	内服	→	→	→	→	→	休	休
				1コース26日間（5日間連続経口投与し、3週間休薬）						

エトポシド内服療法（B法）

			Day	1	2	3	4	5	…	21	…	28	(…	35)
VP16	ラステットS	50 mg/body	内服	→	→	→	→	→	→	→				
				1コース4-5週（21日間連続経口投与し、1～2週間休薬する）										

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

エプキンリ皮下注療法

【1コース目】			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	エプキンリ皮下注	0.16 mg/body	皮下注射	↓							
		0.8 mg/body	皮下注射			↓					
		48 mg/body	皮下注射					↓		↓	
				1コース28日間							

【2-3コース目】			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	エプキンリ皮下注	48 mg/body	皮下注射	↓		↓		↓		↓	
				1コース28日間							

【4-9コース目】			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	エプキンリ皮下注	48 mg/body	皮下注射	↓				↓			
				1コース28日間							

【10コース目以降】			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	エプキンリ皮下注	48 mg/body	皮下注射	↓							
				1コース28日間							

【以下のいずれかに該当する投与遅延があった場合は、CRSを軽減するために、1サイクル目の投与方法に戻して再び投与を開始する。】

- 0.16mgと0.8mgの投与間隔が8日を超えた場合
- 0.8mgと48mgの投与間隔が14日を超えた場合
- 48mgの投与間隔が6週間を超えた場合

濾胞性リンパ腫

G-CHOP 療法

【1コース目】

				Day	1	2	3	4	5	…	8	…	#	…	#
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓						↓		↓		
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓										
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓										
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓										
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓						
					1コース21日間										
					CHOP療法6コース、ガザイバ注は8コース										

※CHOPはDay2でも可

【2～6コース目】

				Day	1	2	3	4	5	…	21
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓						
ADM	ドキソルビシン	50mg /m^2		点滴静注	↓						
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓						
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓						
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓		
					1コース21日間						
					CHOP療法6コース、ガザイバ注は8コース						

※CHOPはDay2でも可

【7～8コース目】

				Day	1	2	3	4	5	…	21
ガザイバ		1000mg /body		点滴静注	↓						
					1コース21日間						
					ガザイバ注は8サイクル						

G-CVP 療法

【1コース目】

				Day	1	2	3	4	5	…	8	…	15	…	21
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓						↓		↓		
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓										
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓										
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓						
					1コース21日間、8コース										

※CVPはDay2でも可

【2～8コース目】

				Day	1	2	3	4	5	…	21
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓						
CPA	エンドキサン	750mg /m^2		点滴静注	↓						
VCR	オンコビン	1.4mg /m^2	最大2mg	静注	↓						
PSL	プレドニン	50mg /m^2		内服	↓	↓	↓	↓	↓		
					1コース21日間、8コース						

※CVPはDay2でも可

G-B 療法

【1コース目】

				Day	1	2	…	8	…	15	…	21	…	28
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓			↓		↓				
Bendamustine	トレアキシン	90mg /m^2		持続静注	↓	↓								
					1コース28日間、6コース									

※BendamustineはDay2-3でも可

【2～6コース目】

				Day	1	2	…	28
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓			
Bendamustine	トレアキシン	90mg /m^2		持続静注	↓	↓		
					1コース28日間、6コース			

※BendamustineはDay2-3でも可

ガザイバ維持療法

				Day	1	…	56
	ガザイバ	1000mg /body		点滴静注	↓		
					1コース２ヶ月、単剤で最大2年投与		

リツキシマブ＋レナリドミド療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
1コース目	リツキシマブ	375 mg/m^2		点滴静注	↓		↓		↓		↓	
	レブラミド	20 mg/body		内服	→	→	→	→	→	→	休	休
					1ｺｰｽ28日間							

↓

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
2～5コース目	リツキシマブ	375 mg/m^2		点滴静注	↓							
	レブラミド	20 mg/body		内服	→	→	→	→	→	→	休	休
					1ｺｰｽ28日間							

↓

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
6～12コース目	レブラミド	20 mg/body		内服	→	→	→	→	→	→	休	休
					1ｺｰｽ28日間　最大12コース							

非ホジキンリンパ腫［Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL］

タゼメトスタット療法

			Day	1	2	3	…
	タズベリク錠	1600mg　分2	内服	→	→	→	→
				連日内服			

小児限局期　バーキットリンパ腫（非CNS）

B-NHL-03 group2療法　[P→2A→2B→2A→2B]

コースP				Day	1	2	3	4	5	6	7
PSL	プレドニン	30 mg/m^2		内服	→	→	→				
PSL	プレドニン	60 mg/m^2		内服				→	→	→	→
VCR	オンコビン	1 mg/m^2	最大2mg	点滴静注			↓				
CPA	エンドキサン	150 mg/m^2		点滴静注				↓	↓	↓	
MTX	メソトレキセート	12 mg/m^2		髄腔内注射	↓						
HDC	ハイドロコートン	25 mg/m^2		髄腔内注射	↓						

コース2A				Day	1	2	3	4	5	6	7	…	14
DEX	デカドロン	10 mg/m^2		内服	→	→	→	→	→	→	→		
MTX	メソトレキセート	3000 mg/m^2		24hr点滴静注	↓								
VCR	オンコビン	1.5 mg/m^2	最大2mg	点滴静注		↓							
CPA	エンドキサン	250 mg/m^2×2回		点滴静注		↓↓	↓↓	↓↓					
THP	テラルビシン	30 mg/m^2	最大45mg	点滴静注			↓	↓					
MTX	メソトレキセート	12 mg/m^2		髄腔内注射	↓								
HDC	ハイドロコートン	25 mg/m^2		髄腔内注射	↓								
					DEXはday8-11で漸減中止								
					MTX開始36時間後よりロイコボリン救助開始								

コース2B			Day	1	2	3	4	5	…	14
MTX	メソトレキセート	500 mg/m^2	点滴静注	↓						
AraC	シタラビン	150 mg/m^2	96hr点滴静注	→	→	→	→	→		
MTX	メソトレキセート	12 mg/m^2	髄腔内注射	↓						
HDC	ハイドロコートン	25 mg/m^2	髄腔内注射	↓						

day1午後～day5午後
（計96hr）

原発性マクログロブリン血症

DRC療法

			Day	1	2	3	4	5	…	21
RTX	リツキサン	375mg /m2	点滴静注	↓						
DEX	デキサート	20mg /body	点滴静注	↓						
CPA	エンドキサン	100mg mg/m^2 ×2回	内服	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓		
				1コース21日間						

※エンドキサン総投与量は、1000mg/m2

再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫

イブルチニブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	イムブルビカ	560mg /body	内服	→	→	→	→
				連日内服			

再発又は難治性のALK融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫

アレクチニブ内服療法

			Day	1	2	3	4	5	…	…
	アレセンサ	1回300mg、1日2回	内服	→	→	→	→	→	→	→
				連日内服						

※体重35kg未満の場合、1回150mg1日2回