FP (JCOG) 療法

			Day	1	2	З	4	5	•••	•••	28
5-FU		$800 \text{mg}/\text{m}^2$	持続静注	\rightarrow	\rightarrow	1	\uparrow	1	休		
CDDP	シスプラチン	80mg /m ²	点滴静注	\downarrow							
			28	H(4	週) 1		-ス				

FP-RT 療法

			Day	1	2	ത	4	•••	•••	•••	28
5-FU		700 mg $/$ m 2	持続静注	\rightarrow	→	\rightarrow	\rightarrow	休			
CDDP	シスプラチン	$70 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	↓							

*RT: 1.8Gy×30と併用

28日(4週)1コース×2

【患者限定】FP-RT (JCOG)療法

			Day	1	2	3	4	::	•••	•••	28
5-FU		1000 mg $/$ m 2	持続静注	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	休			
CDDP	シスプラチン	75mg /m ²	点滴静注	↓							
ΨDT · 1	のの、火ののとは田			Ω		/田/ 1	_	7			

|28日(4週)1コース *RT: 1.8Gy×30と併用

FP療法(術前 3週毎)

			Day	1	2	ω	4	5	6	 21
5-FU		800mg /m ²	持続静注	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow		
CDDP	シスプラチン	80mg /m ²	点滴静注	\downarrow						
				21	H (3	调) 1	7-	-フ×	· 2	

DTX 療法

			Day	1		00		15	:	22	
DTX	ドセタキセル	$70 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	↓							
				21日~20日(2~4)割で1コーフ							

|21日~28日(3~4週)で1コース|

DTX+S-1 療法

			Day	-		0)			28
S-1 ティー	エスワン	基準量	内服	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	休	休	休	休
DTX ドセタ	キセル	$30 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\downarrow				↓			

S-1:2週間内服·2週間休薬 28日(4週)1コース

※術後補助化学療法で使用する場合は、2~7コース目で使用

TS-1は1コース目(2W1R)、8コース目以降(4W2R)は単剤使用。計1年内服。

PAC 療法

			Day	1		8	•••	15	 22	•••	28
PAC	パクリタキセル	$80 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\rightarrow		\rightarrow		↓	休		休
				28	□ (4	週)1		-ス			

CDDP + VP-16 療法 ☆適応外 [食道小細胞癌のみ]

			Day	1	2	3	•••	8	•••	15	•••	22	•••
CDDP	シスプラチン	$60\sim80$ mg $/m^2$	点滴静注	\									
VP-16	エトポシド	100~120mg /m ²	点滴静注	\	↓	↓							
21日~28日(3~4週)で1コース													

CDDP + CPT-11 療法 ☆適応外 [食道小細胞癌のみ]

			Day	1	•••	80	 15	•••	22	28
CDDP	シスプラチン	$60 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\rightarrow						
CPT-11	イリノテカン	$60 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	\downarrow		\rightarrow	\downarrow			
				28	⊟(4	週)1	 -ス	-		

5FU+Nedaplatin療法

			Day	1	2	З	4	5	•••	28
5FU		800mg /m ²	点滴静注	1	1	1	1	1		
NDP	アクプラ注	90mg /m ²	点滴静注	↓						
				28	∃ (4	週) 1		·ス		

mFOLFOX6 療法

			Day	1			 15	•••	• • •	• • •
<i>1</i> -LV	レボホリナート	$200 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow			↓			
L-OHP	エルプラット	$85 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	↓			↓			
5-FU		$400 \text{mg} / \text{m}^2$	静注	\			\downarrow			
5-FU		$2400 \text{mg}/\text{m}^2$	持続静注	\rightarrow	(46ł	nr)	\rightarrow	(46h	nr)	
				厚油	担じ	ī				

ニボルマブ療法

		Day	1	•••	14	
Nivolumab オプジーボ	240mg/body	点滴静注	\rightarrow			
			14	⊟1:	コース	ス

又は

			Day	1	•••	14		28
Nivolumab	オプジーボ	480mg/body	点滴静注	\downarrow				
	•	•		28	⊟1:] —]	ス	

ペムブロリズマブ療法 (3週間毎 または 6週間毎)

		Day	1	• • • •	21	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	\downarrow			
			21	⊟ (3週) 1コース
又は						

			Day	1	•••	21	•••	42	
キイト	〜ルーダ	400mg/body	点滴静注	\downarrow					
				42	 	6週)	1 1	コーフ	 Z

ペムブロリズマブ+FP療法(3週毎)

			Day	1	2	3	4	5	•••	•••	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓							
5-FU		800mg /m ²	持続静注	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	休		
CDDP	シスプラチン	80mg /m ²	点滴静注	↓							
	_	·		0.4		VEL A					

21日(3週)1コース

又は

ペムブロリズマブ+FP療法(6週毎)

		Day	1	2	Э	4	5	•••	22	23	24	25	26	•••	42
キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓												
	$800 \text{mg}/\text{m}^2$	持続静注		1	1	\rightarrow	\rightarrow	休	\rightarrow	1	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	休	
シスプラチン	$80 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	↓						\downarrow						
	キイトルーダ シスプラチン	800mg /m ²	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 800mg/m ² 持続静注	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓ 800mg/m² 持続静注 →	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓ 800mg/m² 持続静注 → →	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓ 800mg/m² 持続静注 → → →	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓ 800mg/m² 持続静注 → → →	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓ 800mg /m² 持続静注 → → → → →	キイトルーダ 400mg/body 点滴静注 ↓						

42日(6週)1コース

Nivolumab(2週毎)+Ipilimumab療法

		Day	1	•••	15	•••	29	•••	42
オプジーボ	240mg/body	点滴静注	\downarrow		\downarrow		↓		
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	\downarrow						
			42E	3(6)	司) 1 🗆	コーフ	ζ		

Nivolumab(3週每)+Ipilimumab療法

		Day	1		22	•••	42
オプジーボ	360mg/body	点滴静注	\downarrow		\rightarrow		
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	\downarrow				
			42	∃(6)		コース	ζ

Nivolumab (2週每) +FP療法

		-									
			Day	1	2	3	4	5	 15	•••	28
	オプジーボ	240mg/body	点滴静注	\downarrow					\		
5-FU	フルオロウラシル	800mg /m ²	持続静注	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow			
CDDP	シスプラチン	80mg /m ²	点滴静注	↓							
				28	□ (4	週) 1		-ス			

Nivolumab (4週毎) +FP療法

略語	薬品名	用量	Day	1	2	3	4	5	•••	15	•••	28
	オプジーボ	480mg/body	点滴静注	\downarrow								
5-FU	フルオロウラシル	$800 \text{mg}/\text{m}^2$	持続静注	\uparrow	1	1	1	1				
CDDP	シスプラチン	80mg /m ²	点滴静注	↓								
L												

28日(4週)1コース

患者限定 Nivolumab+mFOLFOX6 療法

			Day	1		• • • •	•••	15			•••
	オプジーボ	240mg/body	点滴静注	↓				→			
<i>1</i> -LV	レボホリナート	200mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	$85 \text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	↓				→			
5-FU	フルオロウラシル	$400 \text{mg}/\text{m}^2$	静注	↓				→			
5-FU	フルオロウラシバ	2400mg/m ²	持続静注	\rightarrow	(46ł	nr)		\rightarrow	(46h	nr)	
				14	H(2调	1 -] — 7	<u></u> Ζ		

術前DCF療法

			Day	1	2	თ	4	15	:	21
DTX	ドセタキセル	$70 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow						
CDDP	シスプラチン	$70 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\downarrow						
5-FU	フルオロウラシル	$750 \text{mg} / \text{m}^2$	点滴静注	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow		

21日(3週)1コース、計3コース