MSI-Hの固形がん

ペムブロリズマブ療法

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
				42日（6週）1コース				

TMB-Hの進行・再発固形がん

ペムブロリズマブ療法

			Day	1	…	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
				21日（3週）1コース		

又は

			Day	1	…	21	…	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
				42日（6週）1コース				

NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌

エヌトレクチニブ療法

			Day	1	2	3	…
	ロズリートレク	600mg/body	内服	→	→	→	→
				成人では600mg連日服用、適宜減量			

原発不明癌

ニボルマブ療法

			Day	1	…	14
Nivolumab	オプジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
				14日1コース		

又は

			Day	1	…	14	…	28
Nivolumab	オプジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
				28日1コース				

悪性軟部腫瘍

トラベクテジン療法

		Day	1	…	21
ヨンデリス	1.2 mg/m^2	24時間 持続静注	↓		
			1コース21日間		

血管肉腫

PTX 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…	43	…	50	…
PTX	パクリタキセル	100 mg/m^2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓		×		×	
				1コース56日（6投2休）															

BRAF遺伝子変異陽性　固形がん（結腸がん、直腸がん除く）

ダブラフェニブ＋トラメチニブ併用療法

			Day	1	2	3	…
	タフィンラー	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	→
	メキニスト	1回2mg、1日1回	内服	→	→	→	→
		※2剤共、空腹時に投与		連日投与			

※患者の状態により適宜減量可

BRAF遺伝子変異陽性　膵がん

患者限定　ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ +ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	ビラフトビ	1日1回、1回300mg	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
	メクトビ	1日2回、1回45mg	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
				連日内服							

HER2変異陽性　子宮癌肉腫

患者限定　トラスツズマブ　デルクステカン療法

			Day	1	…	21
	エンハーツ	5.4mg /kg	点滴静注	↓		
				1コース21日間		

CDKN2A変異陽性　肺腺がん

患者限定　アベマシクリブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ベージニオ	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	
				連日内服			

CDK4変異陽性　子宮頸がん

患者限定　アベマシクリブ内服療法

			Day	1	2	3	…
	ベージニオ	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	
				連日内服			