

# 悪性黒色腫 [Melanoma]

## DAV-Feron 療法

			Day	1	2	3	4	5	...	...	...	...	...
ACNU	ニドラン*不採用	50~80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓									
DTIC	ダカルバジン*用時	80~140mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓	↓	↓					
VCR	オンコピン	0.6~0.8mg /m <sup>2</sup>	静注	↓									
IFN-β	フェロン*不採用	300万単位 /日	皮下注	↓	↓	↓	↓	↓	(~最大10日まで)				
													4~6週毎に繰り返す

## DAC-Tam 療法 ☆シスプラチン、ノルバデックスは適応外

			Day	1	2	3	4	5	...	...	...	...	...
ACNU	ニドラン*不採用	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓									
DTIC	ダカルバジン*用時	220mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓							
CDDP	シスプラチン	25mg /m <sup>2</sup>	静注	↓	↓	↓							
TAM	ノルバデックス	20mg /日	内服	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
													4週毎に繰り返す