

慢性リンパ性白血病[CLL]

FCR(oral)療法

Cycle 1			Day	1	2	3	4	5	6	...	28
Rituximab	リツキサン	375mg /m ²	点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	150mg /m ²	内服		→	→	→	→	→		
Fludarabine	フルダラ	24mg /m ²	内服		→	→	→	→	→		

Cycle 2-6			Day	1	2	3	4	5	6	...	28
Rituximab	リツキサン	500mg /m ²	点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	150mg /m ²	内服	→	→	→	→	→	→		
Fludarabine	フルダラ	24mg /m ²	内服	→	→	→	→	→	→		

28日を1コースとして計6サイクル

FCR(div)療法

Cycle 1			Day	1	2	3	4	28
Rituximab	リツキサン	375mg /m ²	点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	250mg /m ²	点滴静注		↓	↓	↓				
Fludarabine	フルダラビン	25mg /m ²	点滴静注		↓	↓	↓				

Cycle 2-6			Day	1	2	3	4	28
Rituximab	リツキサン	500mg /m ²	点滴静注	↓							
CPA	エンドキサン	250mg /m ²	点滴静注	↓	↓	↓					
Fludarabine	フルダラビン	25mg /m ²	点滴静注	↓	↓	↓					

28日を1コースとして計6サイクル

Venetoclax-Rituximab療法

漸増期 (1-5週)			Day	1	...	7
1週目	ベネクレクタ	20mg /body	内服	→	→	→
2週目	ベネクレクタ	50mg /body	内服	→	→	→
3週目	ベネクレクタ	100mg /body	内服	→	→	→
4週目	ベネクレクタ	200mg /body	内服	→	→	→
5週目	ベネクレクタ	400mg /body	内服	→	→	→

↓

維持投与期：併用1コース目 (6-9週目)			Day	1	2	...	28
	ベネクレクタ	400mg /body	内服	→	→	→	→
Rituximab	リツキサン	375mg /m ²	点滴静注	↓			

1コース28日間

↓

維持投与期：併用2-6コース目 (10-29週目)			Day	1	2	...	28
	ベネクレクタ	400mg /body	内服	→	→	→	→
Rituximab	リツキサン	500mg /m ²	点滴静注	↓			

1コース28日間
(リツキサンの併用は計6コース)

↓

維持投与期：30週目以降			Day	1
30週目以降	ベネクレクタ	400mg /body	内服	→	→	→

Acalabrutinib+Obinutuzumab療法

			Day	1	2	...	8	...	15	...	28
	カルケンス	100mg x2回	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
2コース目	ガザイバ	100mg /body	点滴静注	↓							
	ガザイバ	900mg /body	点滴静注		↓						
	ガザイバ	1000mg /body	点滴静注				↓		↓		
3-7コース目	ガザイバ	1000mg /body	点滴静注	↓							
			1コース28日間								

ザヌブルチニブ単独療法

			Day	1	...
	ブルキンザ	160mg x2回	内服	→	→