

MSI-Hの固形がん

ペムブロリズマブ療法

				Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注		↓		
21日（3週）1コース							

又は

				Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注		↓				
42日（6週）1コース									

TMB-Hの進行・再発固形がん

ペムブロリズマブ療法

				Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注		↓		
21日（3週）1コース							

又は

				Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注		↓				
42日（6週）1コース									

NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌

エヌトレクチニブ療法

				Day	1	2	3	...
	ロズリートレク	600mg/body	内服		→	→	→	→
成人では600mg連日服用、適宜減量								

原発不明癌

ニボルマブ療法

				Day	1	...	14
Nivolumab	オブジーボ	240mg /body	点滴静注		↓		
14日1コース							

又は

				Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オブジーボ	480mg /body	点滴静注		↓				
28日1コース									

悪性軟部腫瘍

トラベクテジン療法

			Day	1	...	21
	ヨンデリス	1.2 mg/m ²	24時間 持続静注	↓		
1コース21日間						

エリブリン療法

			Day	1	...	8	...	15	...
	ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注	↓		↓			
21日を1コース									

血管肉腫

PTX 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	43	...	50	...
PTX	パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓		×		×	
1コース56日（6投2休）																			

BRAF遺伝子変異陽性 固形がん（結腸がん、直腸がん除く）

ダブラフェニブ+トラメチニブ併用療法

			Day	1	2	3	…
	タフィンラー	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	→
	メキニスト	1回2mg、1日1回	内服	→	→	→	→
※2剤共、空腹時に投与				連日投与			
※患者の状態により適宜減量可							

BRAF遺伝子変異陽性 膵がん

患者限定 インラフェニブ + ビニメチニブ 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
	ビラフトビ	1日1回、1回300mg	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
	メクトビ	1日2回、1回45mg	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
連日内服											

HER2変異陽性 固形がん（胃がん除く）

患者限定 トラスツズマブ デルクステカン療法

			Day	1	...	21
	エンハーツ	5.4mg /kg	点滴静注	↓		
1コース21日間						

CDKN2A変異陽性 肺腺がん

患者限定 アベマシクリブ内服療法

			Day	1	2	3	...
	ページニオ	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	
連日内服							

CDK4変異陽性 固形がん

患者限定 アベマシクリブ内服療法

			Day	1	2	3	...
	ページニオ	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	

連日内服