

## MSI-Hの固形がん

### ペムプロリズマブ療法

				Day	1	...	21	
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓				
								21日(3週)1コース

又は

				Day	1	...	21	...	42	
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓						
										42日(6週)1コース

## TMB-Hの進行・再発固形がん

### ペムプロリズマブ療法

				Day	1	...	21	
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓				
								21日(3週)1コース

又は

				Day	1	...	21	...	42	
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓						
										42日(6週)1コース

## NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌

### エヌトレクチニブ療法

				Day	1	2	3	...	
	ロズリートレク	600mg/body	内服	→	→	→	→		
									成人では600mg連日服用、適宜減量

## 原発不明癌

### ニボルマブ療法

				Day	1	...	14	
Nivolumab	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	↓				
								14日1コース

又は

				Day	1	...	14	...	28	
Nivolumab	オブジーボ	480mg/body	点滴静注	↓						
										28日1コース

## 悪性軟部腫瘍

### トラベクテジン療法

				Day	1	...	21	
	ヨンデリス	1.2 mg/m <sup>2</sup>	24時間 持続静注	↓				
								1コース21日間