

## 骨髓異形成症候群 ( Myelodysplastic syndrom, MDS )

### Ara-C 少量 療法 ( LD-AC )

			Day	1	...	...	8	...	...	14	...	...	21
Ara-C	シタラビン	10mg /m <sup>2</sup> × 2	皮下注	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	( ↓ ↓ ↓ )	↓

または

			Day	1	...	...	8	...	...	14	...	...	21
Ara-C	シタラビン	20mg /m <sup>2</sup>	持続静注 (24hr)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	( ↓ ↓ ↓ )	↓

### CAG 療法

			Day	1	2	3	4	...	8	...	...	14	...	...	21	
Ara-C	シタラビン	10mg /m <sup>2</sup> × 2	皮下注	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	( ↓ ↓ ↓ )	↓
ACR	アクラシノン*用時	14mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓	↓								(Day 8,9,10追加の場合あり)	

(70歳以上：10mg/m<sup>2</sup>)

G-CSF	グランシリンジ	2~5 μg /kg	皮下注	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
-------	---------	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

### レナリドマイド内服 療法【5番染色体長腕部欠失を伴うMDS】

☆登録医師のみ処方可能

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
レナリドマイド*	レブラミド	10mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	休	

4週間隔で繰り返す

### Azacitidine(ビダーザ) 療法

			Day	1	2	3	4	5	6	7
azacitidine	ビダーザ**用時	75mg /m <sup>2</sup>	皮下注 または	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

28日(4週間)を1コース